

**DE POLYPO
MALIGNO
SPECIMEN QUOD
AD SUMMOS IN
MEDICINA...**

Isaia Agosti



DE
POLYPO MALIGNO
SPECIMEN
QUOD AD SUMMOS IN MEDICINA
HONORES AUREO DIPLOMATO IN QUAERENDUM
ARCHIGYMNASIO PATAVINO
PUBLICE JURIS PACTO
ISAIAS AGOSTI
VERONENSIS.



PATAVII
TYPIS SEMINARI
MDCCCXXII.



Handwritten signature or name.

AMICO ET COLLEGE

DOCTORI ERECTORI

SALVATORI THOMEI

In tanto argumentorum numero quas adolescentes pro summis honoribus in medicinas obtinendis sibi pertractanda suscipiunt, in tanta hujus Archigymanasii luce, coram Vobis, Praeceptores sapientissimi, quorum difficile dicta est utrum studiosi adolescentes virtutem et doctrinam magis venerentur, an animi magnitudinem diligunt, quid ego proferre possem, cum exercendae medicinae facultatem ab humanitate vestra imploraverim, longo tempore anceps haesi. Porro postquam in Athenaeo Ticinensi a clarissimis Praeceptoribus in

4

chirurgica arte eruditus fui, decem et octo-
 jam abhinc annis eam professus sum; ideo-
 que non posuitandus mihi medicorum quorun-
 dam sententias esse existimari, neque eam-
 dem cruentam requirere, sed inter morbos, quos
 pertractandos suscepì, unum in meam memo-
 riam revocari, qui summi Hippocratis auctoritate
 confirmat, optimam videlicet medicinam inter-
 dum esse medicinam non facere.

~~Summi Hippocratis~~.



Membrana illa mucosa quae Schrönderiæ, olfactoria, vel pituitaria nuncupatur, quæque totum indit narum existit, carnosæ quibusdam carunculis sive excrescentiis præter naturam obnoxia est, quæ Medici *Polypus* dicunt perinde ac si pluribus radicibus tanquam pedibus sint instructæ. Si videlicet homo catarhis aut coryza frequenter fuerit affectus, si ulcus quoddam naris occupaverit, si sanguis aspicitur ab eo organo stillaverit, dispositionem facillimam ad Polypi evolutionem ei inesse existimabimus. Quod si causæ illæ remota violentia quodam exterior accedat, ut lapsus aut letus, actio pulveris sternutatorii, irritatio quælibet membranæ illius, quæ mollis est et spongiosa, tum a viscerum lætione nasci fert vegetatio locum habet in aliquo ipsius membranæ puncto, quæ sensim atroxque major volumen acquirit, et Polypum constituit. Magnitudo Polypi variæ est ut et evolutionis periculus. Refert Heisterus clarissimus se Polypos vidisse, qui intra tres aut quatuor dies ita erant aucti, ut e naribus pendebant. Neque semper eam viam tenent: quandoque enim per naris posteriores in

fasciis eorum descendunt, et adeo incrementum, ut non solum loquendi ac deglutendi, sed spirandi quoque difficultatem inducant, quemadmodum Celsus observat.

Non una tamen eademque est Polypi utriusque natura atque indoles. Quandoque enim albus, subrubidus, mollis, nullis fere stipatus doliisbus est, prope nasi orificia situs, tenui instructus radice, quique facile prolongari aut educi potest e naso: mitis tunc Polypus appellatur a chirurgia sive benignus, praesertim si aeger firmior sit habitus, nullaque labe inquinatus. Gravis a contra seu malignus est Polypus, qui cum doloribus atque duritie lset, aut sanguis, pus et acriorem foetidamque humorem emittit, alius locatur, crassique adhucet radice, et homo scorbutica vel venerea affectione laboraverit. Quemadmodum ergo in benigno Polypo levis periculum est in prompta curatione, difficilis autem curatur, aut ad carcinoma malignum facile vergit, ita praedens et semper reservatum vaticinium hori quidem nos, dum praesertim pro certo habemus hujusmodi morbum fontem haudisse, aut primitus et eminere ex viribus vitalibus perturbatis, aut morbo jam adstante dispositione ex causis externis. Quapropter non solum vires vitales perdifficilis in hisce morbis restaurantur, sed etiam cura chirurgica, qua utimur, extirpatio nempe et ligatura, raro morbo opulatur, immo plerumque pristinum inflammationis incendium alit aut majus reddit. Neque Polypus curari potest nisi a propis sede removeatur.

Non ignoreo nemulos fuisse, qui medicamentis rodentibus uti sunt, ut sensim sensimque caruncula carnea copiameretur. Verum summo hic studio opus est, ne partes nasi quas sanas sunt, simul erodantur. Celeberrimus Parisiensis chirurgus Tibbaut hinc minuta spherula cerato imbuta Polypum inter et naris parietis sinus inficiebat, deinde pericillo vel turunda antimeris butyro infusa Polypum tangebatur: statim aqua pura tumoris superficiem expurgabat, ne videlicet rodens actio medicamenti altius vel latius, quam par est, penetraret. Dicant Tibbautum momento temporis rem feliciter absoluisse. Dubito vero quam plurimum, an ad Polypi curationem rodens medicamentum semel tantum sit adhibendum, praesertim si Polypi moles magna sit, et crassiori instructa radice. Quod si pluries ad istiusmodi remedium confugendum est, valde pertimescerem ne aliquando ab ipso remedio actiones aliae et generales inflammationis foret expectanda. Idem et de mercurii sublimati, de lapidis infernalis et caustici, de acidi sulphurici usu dicendum est, et eo magis quod experientia quotidiana nos edocet Polypum etiam benignum in malignum converti posse, si metamorphosis ultro progrediatur, et in tecturam scirrhosam aut cancerosam abeat. Ecce nunc tibi quanta sit ab aegro non minus quam a chirurgo diligentia adhibenda, ne causae irritantes illum offendant, et inflammationem ultro propellant!

Si varia victorum opera perlustrentur, quam plurimos extare videbimus, qui radicalem Polypi maligni curam adhortantur, inter quos recense-

mus Theden, Richter, Joannem Bell; at celeberrimi Pott et Scarpa, priores in suis operibus chirurgiae, alter in suis clinicæ chirurgicæ lectionibus a me plures auditis omnino dismulerent, et fere temerariam operationem declarant, quippe quæ gravioribus morbis curam præbere valeat. Vir ille egregius, et de studiis meis optime meritus Professor Scarpa ita de hac re discipulos admonuit: « Duae Polyporum species habentur, » benigna vel maligna, in quibus recte distinguen- » dis studium præcipue nostrum vertere debe- » mus, eo quod Polypus benignus curam admittit, » malignus contra omni medelæ resistit, quolo im- » mo sub regiminis chirurgico exasperatur: sper- » tet igitur peroptimam cognitionem de hac te- » ueri ne seger summo detrimento, et chirurgus, » qui hanc curam assuerit, summo dedecore o- » mnes conatus et labores irritos videant. »

Quibus sane comitis frater ita in teterrimâ hujus morbi cura me gessit, ut si seger unus ad sanectam pervenit, Hippocratiæ illato suam debuerit vitam, quia nullam ipsi medelam adhibui; si falsis alter concessit, id impudentiæ chirurgi tribuen- dum censo. Historicis hîc addam brevissime, ut sanctorum virorum doctrinam de maligno Polypo magis magisque confirmem.

Valentinus Brenzo octo et quadraginta annos ætatis, temperamento sthenico excitabili, gracili- que corporis constitutione donatus, morbo inflammatoris pectoris, catenâ nec non impetiginibus indolis herpeticæ sæpiusque labecavit, a quibus post longum temporis spatium natura tan-

tum adjuvante liberatus est. Sensus sensimque dolores in regione frontis et glabellae excitantur, quibus accendit sensus ardens, et pruriginis per ambas narium cavitates vagans, et ex naribus quidquam sanguinis stillabat. Post annum apparuit in naribus tumor coloris atro-perpuri, sub tactu dolens, emissioque facillime sanguinem. Aeger Baldi montis incolae Veronae petit ut Antiorum Manzoni consulere, qui cum maximo ingenio abundaret, et magni doctrinae prudentiaque polleret, morbum statim Polypum malignum declarare non dubitavit, et adhortatus est aegrum ne auxilium ex chirurgis praestolaretur, quippe quae illi opitulari imper erat omnino; immo medicavit ei tentamen contra mortem fore sollicitaturum. Polypum tamen palativo methodo pertractandum esse affirmavit, emollientibus nempe externe adplicitis, interne vero temperantia remedia jussit esse suppeditanda. Quibus monitis edoctus aeger per sex annos patienter morbum tulit, quin graviori exacerciaretur molesta; nisi quod in posterum naris altera novo Polype occupata fuit, ex quo, ut facile videre est, respiratio per naris sublata erat, et inde per os apertum aerem haurire cogebatur.

Cum res ita se haberet, a parentibus advocatus sum ea fortasse spe, ut in experientissimi chirurgi sententiam eadem iniqua; symptomata vero omnia cum faciem periculis, aperte cognosci maligno Polype aegrum laborare; cum ipse ut eum « cructatu subirem, sed perperam; si vitam eligeret, duci, a manu chirurgica abstinere, et sequere

to

consilium clarissimi Manzoni. Tali pacto spinas-
nem amplexus est, et decematum virgē. Mochus ve-
ro radices ampliores fuit, ita ut latum superius
occuparet: tandem asthmatis accessibus fre-
quenter correptus ob peripneumoniam notum
septuagesimo aetatis anno e vita discessit.

Ignatius Thomae Veronensis quatuor et quadra-
ginta annos natus, firma corporis constitutione habi-
tisque athletico donatus, quatuor obliquo annis eery-
za diuturna laborabat, et eodem tempore per aliquot
necnes de dolore in frontis regione, nec non in an-
gulo orbitae sinistro conquerebatur. Nonnullis etiam
anguinis effusionibus e naribus obnoxius fuit.
Substantiam quandam in sinistra nare pendentem
sibi obstrare armoderant, et consilium meum
parentes expectant. Polypum video ampla basi
lentissimam coloris violacei rubri, et characteres ve-
noses Polypi maligni exhibentem, pronuchasi sta-
tim me caute et diligentissime usum esse cum
eo. Interim cum per aliquot dies nil eger emo-
lumentum persentiret, nulla ratione habita ad id
quod ego aperte parentibus declaraveram, tenta-
mina, me nesciente ipse vero imperantibus, ab
alio chirurgo ad Polypum avellendam facta fuerit;
sed dolores ita assunt, ita solum opprimunt,
talis est haemorrhagia, talis symptomatum series
provenit, ut a tentaminibus desistere omnino
necesse fuerit, et molius radices ampliores pro-
fundioresque fuit; ichor e naribus fluxit foeti-
dissimi odoris, oculusque inflammatione corripie-
batur. Aeger tamen omni adhuc spe non destitutus
ad quandam Italae Universitatem se contulit do-

ctissimorum virorum sume perisagiam, qui in ea fuerunt sententiæ, ut extirpatio rursus esset suscipienda, inflammatio ope setacii-promovenda, et substantia aliqua corrodens Polype esset applicanda. Verum, proh Dñi immortales! morbus horribili modo exacerbatur; summo opere exulceratur Polypus, et cum eo saccus lacrimalis, nec non proximiores partes; oculus narsque tumet; foramen narium posterioribus appendicibus polypeis occlusis; deglutitis ablatæ est; dolores regionem frontis occupantes intolerabiles fiunt, nec narcotica amplius est data potestas aegri potius leniendi. Nulla adest spes, nullum consilium, omnia mortem ostendunt. Jam jam delirium cum alternanti sopore, summa virium dejectio, et macies corporis totius apparent. Pulsus sunt parvi, quandoque desiderantur, et optata extrema dies poenæ finem imponit.

Summa igitur diligentia utendum est, maximumque ingenti acumen exercendum, ut Polyporum species accurate discernantur, ne citius, quam par sit, aeger occumbat. Quæ autem medendi methodus, quæ radicalis cura instituenda sit in Polype maligno, hactenus nescimus; argumentum sane quod doctissimorum virorum considerationem, repetita experimenta, et sagacissimas disquisitiones mereretur.

THESES

I.

Inflammationis transitus a cursu acuto in lentum
nunquam inflammationis indolem mutat.

II.

Non dantur inflammationes asthenicæ.

III.

Apoplexia a sanguine in cerebro congesto aut
effuso semper producitur.

IV.

China China non est remedium specificum in fe-
brilibus intermittentibus.

